

БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ГІДРОЕКОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014

ЗВІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
V Всеукраїнської науково-практичної конференції
молодих учених і студентів

4-5 березня 2014 р.

Житомир
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.
2014

**ВИВЧЕНІСТЬ КЛІТИННИХ ФАКТОРІВ НЕСПЕЦИФІЧНОГО
ІМУНІТЕТУ РИБ ЗА ПРИСУТНОСТІ ТОКСИКАНТІВ**

К. Ю. Ігнатенко¹, Н. В. Ткачук²

^{1,2} Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, вул. Гетьмана Полуботка, 53, Чернігів, 14013, Україна

На сьогоднішній день проблема імунітету риб приваблює дослідників з метою оцінки ролі імунної системи в адаптаційних процесах, в зв'язку з підвищеннем антропогенних навантажень, забрудненням водойм різного роду токсикантами і розробкою імунотестів для оцінки якості вод і токсичного ефекту полютантів на риб [1]. Для риб характерним є домінування неспецифічних факторів захисту, а на ранніх етапах онтогенезу вони є визначальними [2-4]. До неспецифічних факторів захисту відносять фагоцитоз лейкоцитів [5], ретикулоендотеліальну систему [6], неспецифічні цитотоксичні клітини [7].

Основними джерелами забруднення природних вод України є промислові стічні води, комунальні стічні води, сільськогосподарські стоки, нафта і нафтопродукти, поверхневі стоки та атмосферні опади. Природні джерела найбільш забруднені важкими металами, пестицидами, фенолами, поверхнево-активними речовинами [8]. Тому метою роботи було визначити вивченість клітинних факторів неспецифічного захисту риб за присутності розповсюджених токсикантів водного середовища.

Показано, що на присутність карбофосу клітинні фактори імунітету риб реагували зміною функціональної активності. Так, малі концентрації карбофосу (1 мг/л) здійснювали деяку стимулюючу дію на клітинну ланку імунітету [1]. Пентахлорофенол знижував показники неспецифічного імунітету риб (макрофаги/нейтрофіли/активність природних кілерів) [9]. Дихлорофос та трихлороформ також знижували неспецифічну імунну відповідь у коропа [10-11]. Вивчення фагоцитарної функції прісноводних риб Австралії показало, що імунотоксичність пестицидів, яку оцінювали за інгібуванням фагоцитарної активності, знижувалась в ряду: стануморганічні сполуки > ендосульфан > хлорпірифос [12].

Миряков В. Р. зі співавторами [1] процитували роботи, присвячені складу і кількості лейкоцитів, їх фагоцитарної активності при вивчені характеру реагування клітинних факторів імунітету на фенол, радіонукліди, важкі метали. Інформація про клітинні фактори неспецифічної резистентності за присутності важких металів, поліциклічних ароматичних

гідрокарбонатів, поліхлорованих біфенілів також міститься в літературному огляді [13].

Дані імунологічних реакцій риб в умовах підвищеного антропогенного навантаження, зокрема за присутності важких металів проаналізовано та узагальнено в праці [14]. Встановлено інгібуючий вплив іонів кадмію та нікелю на функціональну активність фагоцитів коропа [15]. Зазначено, що при збільшенні дози металу фагоцитарна активність пригнічується. При концентрації нікелю 5 ГДК відмічено незначну активацію фагоцитів. Також зниження фагоцитарної активності нейтрофілів периферичної крові коропа спостерігали за умов дії підвищених концентрацій іонів пллюмбуму [16]. Встановлено зниження стійкості японського вугра до бактерій під впливом купруму, що пов'язують зі зменшенням фагоцитарної активності [17].

В роботі Ivanković T. та Hrgović J. [18] наводиться характеристика біологічної активності сурфактантів (аніонних, катіонних та нейтральних). Зокрема автори зазначають, що більшість тест-організмів токсичності сурфактантів є водними і включають водорості, риб, або в меншому ступені бактерії. В роботі наведено аналіз токсичності ПАР щодо риб, проте відомості впливу цих сполук на клітинні фактори неспецифічної резистентності відсутні. У літературному огляді Lewis M. A. [19], присвяченому аналізу досліджень хронічної і сублетальної токсичності сурфактантів щодо водних тварин також відсутні відомості про їх вплив на клітинні фактори імунітету у риб.

Є повідомлення про дослідження фагоцитозу клітин коропа *Cyprinus carpio in vitro* за присутності бісфенолу А та нонілфенолу. Зазначено, що вказані сполуки впливали на фагоцитарну активність клітин, зокрема за НСТ-тестом зменшували її [20].

Таким чином, клітинні фактори неспецифічної резистентності риб в більшій мірі досліджено за присутності важких металів та пестицидів. У доступній нам літературі відомості про вплив поверхнево-активних речовин на клітинні фактори імунітету обмежені, а власне синтетичних миючих засобів відсутні. Тому подальшою перспективою є дослідження функціональної активності крові риб за присутності синтетичних миючих засобів.

Література

1. Реакция иммунной системы рыб на загрязнение воды токсикантами и закисление среды / [В. Р. Микряков, А. В. Балабанова, Е. А. Заботкина и др]. – М.: Наука, 2001. – 126с.
2. Anderson D. P. Immunotoxicology in fish / D. P. Anderson, M. G. Zeeman // Fundamentals of aquatic toxicology (2th ed.) / Ed. by Rand G. M., Talor and Fransis. – USA, 1995. – P. 371–405.

БІОЛОГІЧНІ ДОСАДЖЕННЯ - 2014

3. Studnicka M. Nonspecific defence barriers and mechanisms in fish / M. Studnicka, A. K. Siwicki, K. Kazun // Fish diseases diagnosis and preventious methods. - Olsztyn: Widawnictwo IRS, 1993. - P. 105-111.
4. A common carp (*Cyprinus carpio L.*) leucocyte cell line shares morphological and functional characteristics with macrophages / F. A. A. Weyts, J. H. W. M. Rombout, G. Flik, B. M. L. Verburg-Van Kemenade // Fish Shellfish Immunol. - 1997. - № 7. - P. 123-133.
5. Secomber C. J. The nonspecific immune system: cellular defences / C. J. Secomber // The fish immune system. / G. Iwama, T. Nakanishi // Fish Physiology series. - Vol. 15. - San Diego: Academic Press, 1996. - P. 63-103.
6. Dalmo R.A. Non-specific defence mechanisms in fish, with particular reference to the reticuloendothelial system (RES) / R. A. Dalmo, K. Ingebrigsten, J. Bogwald // J. Fish Dis. - 1997. - № 20. - P. 241-273.
7. Evans D. L. Nonspecific cytotoxic cells as effectors of immunity in fish / D. L. Evans, L. Jaso-Friedmann // Ann. Rev. Fish Dis. - 1990. - № 2. - P. 109-121.
8. Ваганов І. І. Інженерна геодогія та охорона навколоїнського середовища: навч. посібн // І. І. Ваганов, І. В. Масленка, М. М. Попович. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до посібника:
<http://posibnyky.vntu.edu.ua/geologiya/index.html>.
9. Anderson R. S. In Vitro Inhibition of Medaka Phagocyte Chemiluminescence by Pentachlorophenol / R. S. Anderson, L. L. Bruegger // Fish and Shellfish Immunology. - 1992. - № 2. - P. 299-309.
10. Cossarini-Dunier M. Effects of Organophosphorus Insecticides. Effects of Trichlorfon and Dichlorvos on the Immune Response of Carp (*Cyprinus carpio*): III. In Vitro Effects on Lymphocyte Proliferation and Phagocytosis and In Vivo Effects on Humoral Response / M. Cossarini-Dunier, A. K. Siwicki, A. Demael // Ecotoxicology and Environmental Safety. - 1991. - № 22. - P. 79-87.
- 11.ii. Vivo Effect of an Organophosphorus Insecticide. Trichlorfon on Immune Response of Carp (*Cyprinus carpio*): II. Effect of Trichlorfon on Nonspecific Immune Response in Carp (*Cyprinus carpio*) / A. K. Siwicki, M. Cossarini-Dunier, M. Studnicka, A. Demael // Ecotoxicology and Environmental Safety. - 1990. - № 19. - P. 103-105.
12. Bradford A. D. The effects of in vitro pesticide exposures on the phagocytic function of four native Australian freshwater fish / A. D. Bradford, K. O'Halloran, P.F.A. Wright // Ibid. - 2005. - Vol. 75, № 4. - P. 330-342.

БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ - 2014

13. Ecotoxicology and immunity in fish / N. C. Bols, J. L. Brubacher, R. C. Ganassin, L.E.J. Lee // Developmental and Comparative Immunology. – 2001. – № 25. – P. 853–873.
14. Онисковець М. Показники імунного статусу риб у біомоніторингу важких металів у навколошньому середовищі / М. Онисковець // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 60. – С. 190–197.
15. Дрогомирецька І.З. Особливості фагоцитарної активності лейкоцитів крові *Cyprinus carpio* L. під впливом іонів кадмію та нікелю / І. З. Дрогомирецька, М. А. Мазепа // Природничий альманах. Біологічні науки. – 2008. – Вип.10. – С. 60–67.
16. Данилів С. І. Реакція лейкоцитів периферичної крові коропа на надлишкові концентрації свинцю / С. І. Данилів, М. А. Мазепа // Рибогосподарська наука України. – 2009. – № 2. – С. 105–109.
17. Mushiane K. Powered phagocytosis in the blood of cells exposed to cooper / K. Mushiane, T. Nahao, K. Nuroga // Fish Patol. – 1985. – 20, № 1. – P. 49–53.
18. Ivanković T. Surfactants in the environment / T. Ivanković, J. Hrenović // Arh. Hig. Rada Toksikol. – 2010. – № 61. – P. 95–110.
19. Lewis M. A. Chronic and sublethal toxicities of surfactants to aquatic animals: a review and risk assessment / M. A. Lewis // Mar. Res. – 1991. – Vol. 25, № 1. – P. 101–113.
20. Gushiken Yoshiki. In vitro effect of carp phagocytic cells by bisphenol A and nonylphenol / Gushiken Yoshiki, Watanuki Hironobu, Sakai Masahiro // Fisheries Science. – 2002. – Vol. 68, Issue 1. – P. 178–183.

УДК 577.25+612.014+574.64

АЛЬТЕРАЦІЯ КЛІТИННИХ МЕМВРАН *LEMNA MINOR* L. ПІСЛЯ ТОКСИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

К.В. Костюк¹, В.В. Грубінко²

¹ Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, вул. Проспект перемоги, 34, Київ, 01601, Україна
² Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, Тернопіль, 46013, Україна

Як відомо, практично будь-який захист від негативного впливу реалізується на клітинному рівні, а універсальною для всіх клітин є їх мембранина будова. Клітина має систему взаємопов'язаних мембран, бо зовнішня мембра на клітини, сідоплазматичний ретикулум, мітохондріальна, лізосомна, ядерна мембрани і апарат Гольджі тісно пов'язані між собою [10].