

У "Хомутовському степу" дещо менше траплялися лучно-лісовий *Temnothorax tuberum*, лучно-степові *Formica glauca* та *Lasius alienus*, політопний *Formica pratensis*, степовий *Plagiolepis tauricus*. Велику роль у степу заповідника грають європейсько-західносибірські (28,6%), турано-степові (25,2%) та транспалеарктичні (21,4%) елементи мірмекофауни.

У "Кам'яних могилах" рідше зустрічалися степові *Messor structor* та *Plagiolepis tauricus*, лучно-степові *Formica glauca* та *Lasius alienus*, політопний *Formica pratensis*. З зоогеографічних комплексів виділялись європейсько-західносибірські (28,0%), транспалеарктичні (24,0%) та турано-степові (20,0%) елементи мірмекофауни.

Треба зазначити, що у мірмекофауні досліджуваних степів помітну роль відіграють середземноморсько-середньоазійські види. У "Хомутовському степу" частка їх становила 14,3%, а у "Кам'яних могилах" – 16,0%.

За ознакою біотопічної переваги виділено 7 екологічних груп: політопний, лучно-лісовий, лучний, лучно-степовий, степовий, лучно-галофільний, псамофільний. У досліджуваних заповідниках виділялись степові та лучно-степові види (у ХС: 35,7% та 25,0%, а у КМ: 32,0% та 28,0% відповідно). У "Хомутовському степу" помітну частку мали також лучні (14,3%) та політопні види (10,7%), а у "Кам'яних могилах" - лучно-лісові та політопні (по 12,0%).

Порівняльний аналіз видових списків (за Жаккаром) показав, що найбільшу подібність мірмекофауна "Хомутовського степу" має з мурахами "Кам'яної могили" ( $Q_{xy}=0,77$ ). Достовірна подібність також є з мірмекофауною "Асканія-Нова" ( $Q_{xy}=0,69$ ), "Стрільцівський степ" ( $Q_{xy}=0,69$ ) та "Провальський степ" ( $Q_{xy}=0,63$ ).

Ми висловлюємо щире подяку О.Г. Радченко за надання допомоги у визначенні матеріалу та за критичні зауваження щодо змісту роботи.

#### СУЧАСНИЙ СТАН ОРНІТОФАУНИ ЧЕРНІГІВЩИНИ

Федун О.М., Корнієнко Т.М

Чернігівський державний педагогічний університет

ім. Т. Г. Шевченка, м. Чернігів

Антропогенна трансформація природного середовища Чернігівщини зумовила зміни у фауністичних комплексах регіону, одним з важливих компонентів яких є орнітоценози. Зміни торкнулися не

лише видового складу пташиного населення, але й статусу перебування окремих видів у межах області.

Сучасна авіфауна Чернігівської області складає 291 вид. Із них, 195 видів гніздиться на території області. За характером перебування в регіоні птахи представлені наступними групами: гніздові перелітні - 141 вид, гніздові осілі - 54 види, пролітні - 44 види, залітні або випадково залітні - 44 види, на зимівлі - 7 видів, інтродуковані - 1 вид.

Протягом останнього десятиріччя зафіксовано нову для регіону родину - ходуличникові (*Recurvirostridae*) та 11 нових видів - гагара червоновола (*Gavia stellata* Pontoppidan, 1763), казарка канадська (*Branta canadensis* Linnaeus, 1758), казарка білощока (*B. leucopsis* Bechstein, 1803), канюк степовий (*Buteo rufinus* Cretzschmar, 1827), фазан (*Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758), ходуличник (*H. himantopus* Linnaeus, 1758), мартин жовтоногий (*Larus cachinnans* Pallas, 1811), чергава (*Hydroprogne caspia* Pallas, 1770), жайворонек малий (*Calandrella cinerea* Gmelin, 1789), плиска гірська (*Motacilla cinerea* Tunstall, 1771), очеретянка садова (*Acrocephalus dumetorum* Blyth, 1849).

Статусу гніздових набуло 9 видів: лебідь-шипун (*Cygnus olor* Gmelin, 1789), норець червоношийї (*Podiceps auritus* Linnaeus, 1758), лунь польовий (*Circus cyaneus* Linnaeus, 1766), чекан чорноголовий (*Saxicola torquata* Linnaeus, 1766), горіхівка (*Nucifraga caryocatactes* Linnaeus, 1758), вівчарик зелений (*Phylloscopus trochiloides* Sundevall, 1837), золотомушка жовтогорола (*R. regulus* Linnaeus, 1758), чиж (*S. spinus* Linnaeus, 1758), снігур (*P. pyrrhula* Linnaeus, 1758). З них, лунь польовий внесений до Червоної книги України.

Сім перелітних видів набули статусу осілих. До них належать: крижень (*Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758), сова болотяна (*Asio flammeus* Pontoppidan, 1763), чикотень (*Turdus pilaris* Linnaeus, 1758), дрізд чорний (*T. merula* Linnaeus, 1758), гаїчка болотяна (*Parus palustris* Linnaeus, 1758), гаїчка-пухляк (*P. montanus* Baldenstein, 1827), костогриз (*C. coccothraustes* Linnaeus, 1758).

На незамерзаючих біоставках очисних споруд протягом останніх років регулярно зимує норець малий (*Podiceps ruficollis* Pallas, 1764), що може привести до формування стійкої тенденції до осілості.

Таким чином, за останні десятиріччя в авіфауні Чернігівщини відбулися зміни, що призвели до розширення ареалу багатьох видів птахів, підвищення видового різноманіття і зміни статусу перебування окремих видів.